

Prevención

La principal medida de prevención es LA VACUNACIÓN.

**La vacuna de SRP se debe aplicar:
la Primera dosis a los 12 meses de
edad y la Segunda dosis a los 18
meses a 4 años de edad.**


La vacuna de SR se debe aplicar:

**Desde los 5 años de edad hasta los
49 años de edad.**



El sarampión puede causar

- Neumonía
- Infecciones del oído
- Ceguera
- O un sarampión hemorrágico que causa sangrados generalizados
- Encefalitis



La vacunación es la estrategia más efectiva para prevenir el **SARAMPIÓN** y la **RUBÉOLA**.

SARAMPIÓN



La vacunación es la estrategia más efectiva para prevenir el **SARAMPIÓN** y la **RUBÉOLA**.

¿Qué es el sarampión



Es una enfermedad muy contagiosa, causada por un virus, provoca una erupción cutánea en todo el cuerpo y síntomas gripales, que se puede adquirir en cualquier edad, incluso en la vida adulta si una persona no la padeció en la infancia.

Los niños pequeños no vacunados son quienes corren mayor riesgo de sufrir el sarampión.

Signos y síntomas


Fiebre alta



rinorrea

Ojos rojos

Y llorosos



Erupción cutánea roja que comienza y se extiende por el cuerpo

¿Cómo se transmite?

El virus del sarampión es muy contagioso, se propaga en el aire:

- **Tos**
- **Estornudo**
- **Contactos con personas infectadas**
- **Secreciones nasales**



EL SARAMPIÓN SE TRASMITE CUANDO...

una persona infectada tose o estornuda, y el virus se queda en el ambiente y en las superficies por 2 horas.

